

# ABRAXANE®-GEMZAR®

Formulation de nanoparticules de paclitaxel liées à l'albumine  
 Inhibe le développement et la division des cellules cancéreuses  
 1<sup>ère</sup> ligne métastatique de l'adénocarcinome du pancréas  
 Traitement administré jusqu'à progression de la maladie  
 ou toxicité inacceptable

**ABRAXANE**  
**125mg/m<sup>2</sup>**  
 Perf. 30min

Rinçage  
 à base de  
 NaCl

**GEMZAR**  
**1000mg/m<sup>2</sup>**  
 Perf. 30min

**J1, J8, J15 repos 7 jours**  
**(Cycle 28 jours)**

**Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variables en fonction des personnes.  
 Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous proposons de rester en contact avec l'oncologue référent de la pathologie de votre patient**

| Effets indésirables   | Conduite et traitement à tenir.  |
|---|--|
| <b>Neutropénie :</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôle de la NFS avant chaque cure</li> <li>▶ En cas de température t° &gt; 38,5°C : NFS en urgence                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ PNN&lt;500/mm<sup>3</sup> et mauvaise tolérance : <u>Hospitalisation</u></li> <li>⊖ PNN&lt;500/mm<sup>3</sup> et bonne tolérance : bilan bactériologique, antibiothérapie orale à large spectre (type AUGMENTIN/CIFLOX) et <u>surveillance au domicile possible</u> après avis de l'équipe d'oncologie référente.                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ PNN entre 500 et 1000/mm<sup>3</sup> : bilan bactériologique, antibiothérapie orale à large spectre (type AUGMENTIN/CIFLOX) et <u>surveillance au domicile</u>.</li> <li>⊖ En l'absence de fièvre, pas de nécessité d'hospitalisation ni d'antibiothérapie.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>▶ Prescription G-CSF préventif en cas de neutropénie profonde selon avis de l'oncologue référent.</li> </ul> |
| <b>Thrombopénie :</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Surveillance saignements ou apparition de pétéchies</li> <li>▶ Transfusion plaquettaire si &lt; 20.000 Pq ou saignement</li> </ul>  |
| <b>Anémie :</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Bilan d'anémie à réaliser (bilan martial, vitaminique, réticulocytes, ...).</li> <li>▶ Prescription d'EPO exceptionnelle à discuter avec l'oncologue référent.</li> <li>▶ Indication de transfusion sanguine si Hb &lt; 8g/dl ou Hb &gt; 8g/dl et mauvaise tolérance clinique</li> </ul>  |
| <b>Neuropathie périphérique: polynévrite sensitivomotrice (paresthésies...)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Traitement symptomatique des douleurs chroniques :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>⊖ GABAPENTINE (Neurontin®) ou PREGABALINE (Lyrica®)</li> <li>⊖ AMITRIPTYLINE (Laroxyl®)</li> </ul> </li> </ul>  |
| <b>Asthénie</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nous recommandons que les patients tentent de rester le plus actif possible : l'exercice physique augmente la résistance à l'effort.</li> <li>▶ Se reposer</li> </ul>   |
| <b>Modification des cheveux :</b>   | Alopécie temporaire et incomplète, cheveux frisés, sensation de brûlure du cuir chevelu qui disparaît spontanément en quelques semaines  |
| <b>Toxicité digestive</b><br><b>Nausées voire vomissements</b>                  | <p><b>1- en traitement préventif :</b><br/>                     antiémétiques de type SETRON (ex. ZOPHREN® ou KYTRIL®)</p> <p><b>2- si nécessaire :</b><br/>                     antiémétiques prokinétiques (ex. MOTILYO®, VOGALENE®, PRIMPERAN®) toutes les 4 heures au besoin.</p>  |
| <b>Interaction médicamenteuse</b>   | Contre Indication : Vaccin antiamarille et vaccins vivants atténués.<br>Déconseillés : Phénytoïne.<br>Précautions avec : anticoagulants (si indispensable, contrôle INR)<br>Si régime sans sel tenir compte de la dose de sodium dans ABRAXANE et GEMZAR<br>Prudence avec les inhibiteurs et les inducteurs du CYP2C8 ou du CYP3A4   |
| <b>Contre-indications</b>   | Hypersensibilité au principe actif<br>Allaitement<br>Grossesse   |
| <b>Précautions d'emploi</b>   | Contraception efficace pour hommes et femmes en âge de procréer pendant le traitement par ABRAXANE. (jusqu'à 1 mois après la fin de traitement pour les femmes et 6 mois pour les hommes).   |

Ces fiches sont téléchargeables sur le site d'Oncomip [www.oncomip.fr](http://www.oncomip.fr)