

ARANESP®


(Darbepoetin Alpha)

Traitement de l'anémie symptomatique chez les patients adultes atteints de pathologies malignes non myéloïdes et recevant une chimiothérapie.

Médicament d'exception.

2 FORMES :

- seringues pré-remplies sécurisées
- stylo injecteur.



Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des personnes. Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous proposons de rester en contact avec l'oncologue référent de la pathologie de votre patient

Effets indésirables	Conduite à tenir et Traitement
Evénements thromboemboliques veineux	<ul style="list-style-type: none"> ▶ En cas d'épisode thromboembolique veineux <ul style="list-style-type: none"> ☞ Prévenir le médecin oncologue référent.
Réactions allergiques	- Rash, érythème
Diminution paramètres du statut martial	
HTA ▶ >135 et/ou > 85 mmHg en auto mesure ▶ >150 et/ou > 100 mmHg ! Contre indication en cas de HTA mal contrôlée	<ul style="list-style-type: none"> ▶ L'HTA transitoire (< 24H) et asymptomatique : pas de modification thérapeutique ▶ L'HTA > 24H et asymptomatique : <ul style="list-style-type: none"> ☞ poursuite du traitement sans modification + traitement antihypertenseur en monothérapie : <ul style="list-style-type: none"> - IEC ou ARA2 (IEC et ARA2 à privilégier en cas de protéinurie > 1g/24heures.) - inhibiteur calcique : classe des dihydropyridines seulement ex : AMLODIPINE ⚠ Vérapamil et Diltiazem Contre indiqués. - Bêtabloquant - Diurétique thiazidique ou de l'anse ▶ L' HTA symptomatique: <ul style="list-style-type: none"> ☞ poursuite du traitement sans modification + traitement antihypertenseur en bithérapie d'emblée ⚠ Crise hypertensive : arrêt définitif du traitement
Modalités de conservation	<u>A conserver au frais entre 2 et 8 degrés dans l'emballage et à l'abri de la lumière (sortie possible une fois de ses conditions de conservation pendant 7 jours au maximum et jusqu'à 25°C. Lorsque le stylo pré rempli a été sorti du réfrigérateur et a atteint la t° ambiante jusqu'à 25° doit être utilisé dans les 7 jours ou doit être éliminé</u>
Mise en garde et précaution d'emploi	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Précaution : Eliminer les carences en acide folique et vitamine B12 Contrôle du statut martial avant et pendant le traitement - Supplémenter en fer en cas de carence et souvent injections de fer IV en hospitalier Surveillance régulière : <ul style="list-style-type: none"> - HTA (au début du traitement) - NFS (au cours des 8 premières semaines de traitement) - Taux d'hémoglobine - Kaliémie - Phosphatémie
Contre-indications :	Hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients

Ces fiches sont téléchargeables sur le site d'Oncomip www.oncomip.fr