

ABSTRAL®

Traitement des accès douloureux paroxystiques (ADP)
Chez les patients adultes utilisant des morphiniques
pour traiter les douleurs chroniques d'origine cancéreuse.

ABSTRAL®

Comprimé sublingual de FENTANYL
100µg 200µg 300µg 400µg 600µg 800 µg
A la demande, en cas d'accès douloureux

CHEZ LES PATIENTS ETANT DEJA SOUS TRAITEMENT DE FOND MORPHINIQUE

4 prises par jour maximum

Attendre au moins 2h entre 2 traitements par
ABSTRAL® et 4 prises par jour maximum

Ces effets sont fréquents mais non systématiques, d'intensité inconstante et variable en fonction des personnes.
Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous proposons de rester en contact avec l'oncologue référent de la pathologie de votre patient

Effets indésirables	Conduite à tenir et Traitement
Les effets indésirables attendus avec ABSTRAL sont les effets indésirables typiques des morphiniques qui diminueront d'intensité avec la poursuite du traitement. Les réactions indésirables potentielles les plus graves associées aux morphiniques sont la dépression respiratoire (qui peut entraîner un arrêt respiratoire), l'hypotension et l'état de choc.	
Dépression respiratoire Rare insuffisance respiratoire	▶ Avertir les patients ▶ Apparition ou majoration d'une dyspnée ou de toute symptomatologie respiratoire pré-existante. ▲ Peut entraîner un arrêt respiratoire
Hypotension	▶ La pression artérielle doit être surveillée Arrêt du traitement en cas de crise hypotensive avérée
Etat de choc	
Constipation	▶ Traitement symptomatique par laxatifs osmotiques. Le patient continue son traitement laxatif qu'il a en association à son traitement morphinique de fond. ▶ Pas de traitement par anticipation. ➔ Alimentation riche en fibres ▶ Risque exceptionnel d'Iléus paralytique
Toxicité digestive	- si nécessaire : antiémétiques prokinétiques (ex. MOTILYO®, VOGALENE®, PRIMPERAN®, ZOPHREN®) toutes les 4 heures au besoin.
Somnolence	<u>ne pas conduire de véhicule ni utiliser de machine</u>
Céphalées	Voir des vertiges
En cas de surdosage	Retirer le comprimé sublingual d'ABSTRAL si le comprimé se trouve encore dans la bouche. Effectuer des stimulations physiques et verbales Déterminer son niveau de conscience Antidote : NALOXON® ou autres antagonistes morphiniques
Interactions médicamenteuses	▶ Précautions : Le Fentanyl est métabolisé par le CYP3A4 Avec les Inhibiteurs du CYP3A4 : - Jus de pamplemousse - macrolides - antifongiques imidazolés - certains inhibiteurs de la protéase peuvent augmenter la biodisponibilité du Fentanyl ▲ Eviter l'alcool

Ces fiches sont téléchargeables sur le site d'Oncomip www.oncomip.fr